Genética Médica
Genética Médica e Forense

COLETA E ENVIO DE RESTOS FETAIS EM ABORTO ESPONTÂNEO

1º

Realizar severa assepsia vaginal com soro fisiológico ou com solução povidine degermante.



2º

Lavar exaustivamente com soro fisiológico, para perfeita assepsia e/ou eliminação de traços dessa solução iodada.

3º

Adicionar em duas cubas rim, dois centímetros de soro fisiológico com 20 mg de garamicina.



4º

Transferir todo material curetado para a primeira cuba.

5º

Ao acabar a curetagem decantar o soro hemático da 1ª cuba e adicionar mais soro limpo.



6º

Repetir o 5º passo até o material ficar razoavelmente limpo.

7º

Passar para a segunda cuba o material mais sugestivo de âmnio e placenta.



8º

Com uma pinça estéril transferir para o frasco com meio de coleta.

9º

Caso não tenha meio de coleta usar um frasco coletor estéril com soro fisiológico. **Não usar luvas com talco.**

10º

Fechar bem os frascos, identificar e enviar o mais rápido possível ao laboratório (24 a 48 horas).

11º

Temporariamente, o material pode ser colocado em geladeira (2 a 8°C).

12º

Não congelar e não adicionar formol ao material.

Campinas / SP
Rua Tenente Haraldo Egídeo de Souza Santos, nº 672
Bairro Guanabara
CEP: 13070-160
19 3243-2544

São Paulo / SP
Rua Eça de Queiroz, nº 376
Bairro Paraíso
CEP: 04011-032
11 5549-4737

www.geneticamedica.com.br

Remeter ao endereço de Campinas-SP